

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	325	217	126	123
ロイシン	1.6%	547	397	226	196
リジン	1.7%	564	199	116	209
メチオニン	0.5%	171	199	109	
シスチン	0.3%	101			
メチオニン・シスチン計	0.8%	271	379	216	143
フェニルアラニン	0.9%	311	271	149	
チロシン	0.7%	241			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	552	434	245	242
スレオニン	1.0%	320	253	143	159
トリプトファン	0.3%	94	83	46	53
バリン	1.1%	372	289	162	129
ヒスチジン	0.9%	298	112	63	60
アルギニン	1.4%	459	199	116	169

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	325	287	250	180
ロイシン	547	483	440	410	110	118
リジン	564	499	340	360	147	139
メチオニン・シスチン計	271	240	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	552	488	380	390	128	125
スレオニン	320	283	250	210	113	135
トリプトファン	94	83	60	70	138	119
バリン	372	328	310	220	106	149
ヒスチジン	298	264	-	120	-	220
全窒素量(g)	1.1					

